

Capstar pligttekst

Capstar Vet. (nitenpyram).

Indikationer: Behandling af loppeangreb hos katte og hunde.

Dosering: Mindst 1 mg/kg. En Capstar 11,4 mg tablet gives til katte og små hunde mellem 1 og 11 kg. Hunde over 11 kg gives en Capstar 57 mg tablet. Må ikke anvendes til dyr under 4 uger eller som vejer mindre end 1 kg.

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes.

Virkning: Det aktive stof, nitenpyram griber ind i nervetransmissionen og fører til voksne loppers død. Effekten på lopper kan ses allerede efter 15-30 minutter. Mellem 95% og 100% effektivitet ses indenfor de første 6 timer og 100% effektivitet nås indenfor 24 timer. Capstar har ingen langtidsvirkning.

Bivirkninger: I den første time efter administrationen kan dyret klø sig mere end normalt. Dette skyldes loppernes reaktion på produktet. Hos katte kan dette i meget sjældne tilfælde vise sig som forbigående tegn på hyperaktivitet.

Læs i øvrigt indlægsseddelen i pakningen.

Pakningsstørrelser: 1x6 tabletter á 11,4 mg. 1x6 tabletter á 57 mg.

Udlevering HV.

**OPLYSNINGERNE ER OMSKREVET OG FORKORTET I FORHOLD TIL DET
GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ. PRODUKTRESUMEET I SIN HELHED KAN
VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA NOVARTIS HEALTHCARE A/S, TLF 39 16 84 00**